


エンハーツ療法 を受けられる患者様へ

エンハーツ療法について

トラスツズマブ デルクステカン（商品名;エンハーツ）とは、トラスツズマブとデルクステカンの複合体であり、トラスツズマブはがん細胞の表面にあるたんぱく質に結合してがん細胞の増殖を抑えます。デルクステカンはがん細胞に直接作用し、がん細胞の増殖を抑えます。

投与スケジュール

1日目にトラスツズマブ デルクステカンを投与します。後の20日間を休みとし、21日間を一区切り(1コース)とします。



ここに示したスケジュールは参考であり、患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

点滴で投与する薬について

デキサメタゾン
アロキシ

吐き気を予防します。
30分かけて投与します。

エンハーツ
(mg)

初回は90分、2回目以降は
30分かけて投与します。

大塚糖液5%

お薬を洗い流します。
5分かけて投与します。

内服薬について

1日目	2日目	3日目
		


吐き気止めのお薬です。吐き気が無くても服用してください。

副作用について

自覚できる副作用

アレルギー反応 熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、すぐにお伝えください。

**遅発性嘔吐
食欲不振
便秘 倦怠感** 気持ちが悪い時には我慢せずに申し出てください。他にもお薬があります。痛みがひどい場合、痛み止めを使うことができます。遠慮せずに申し出てください。



心機能障害

心臓に負担をかける作用があります。
発現時期は定まっていません。
必要に応じて心臓の検査をしますので、
点滴中に限らず、いつもと違うことや
気になることがあった場合は、
遠慮なく申し出てください。

肝障害 腎障害

白血球減少 血小板減少

感染予防のため、手洗いうがいをしっかり
行いましょう。
38℃以上の発熱がある場合は
病院に連絡をして下さい。

自覚できない副作用

その他にも気になる症状がありましたら、
お気軽に医療スタッフまでご相談ください。